

Geachte patiënt,

U heeft besloten om zich onder narcose te laten behandelen in onze praktijk. In 90% van de gevallen gaat het om standaardbehandelingen, dit wil zeggen:

Vullingen, wortelkanaal vullingen, extracties en extracties met plaatsing van een immediaatprothese.

1. Vullingen (éénvlaks-, tweevlaks, drievlaks restauratie, glasionomeerkroon of composietkroon); hierbij wordt het aangetaste (cariëuze) gedeelte van de tand uitgeboord en het ontstane defect wordt opgevuld of opgebouwd met vullingen. Wij gebruiken in onze praktijk alleen witte vullingen.

2. Wortelkanaal vullingen (endodontie) ; hierbij reikt het aangetaste (cariëuze) gedeelte van de tand in de pulpaholte (dit is het levende weefsel waarin zenuwen en bloedvaten zich bevinden.) De wortels van tanden en kiezen zijn hol, binnenin bevindt zich een ruimte die het **wortelkanaal** genoemd wordt. Het aangetaste (cariëuze) gedeelte in deze holte, wordt gereinigd met kleine vijltjes en daarna opgevuld met een kanaalvulling. Na het vullen van de wortels wordt het kroongedeelte (het gedeelte boven het tandvlees) van de tand uiteraard opgevuld met een gewone vulling.

3. Extractie; hierbij wordt de aangetaste tand/kies verwijderd omdat die niet meer te redden is.

4. Extracties gevolgd door plaatsing van een immediaatprothese; hierbij wordt na het verwijderen van alle of een gedeelte van de tanden direct een prothese geplaatst. Dit gaat hier om een noodprothese, die na 5 a 6 maanden dient aangepast of vervangen te worden door een definitieve prothese (kunstgebit). De reden hiervoor ligt bij het genezingsproces van de extractiewonden. Nadat tanden en kiezen getrokken zijn, zwelt de kaak waardoor er drukplekjes kunnen ontstaan, daarna begint het proces dat de kaak lager en smaller wordt. Dat proces gaat direct na het trekken snel (de eerste 1.5 maand), maar daarna gedurende ongeveer 4.5 maand heel langzaam. Omdat het kunstgebit even groot blijft, maar de kaak kleiner wordt, zal het gebit op den duur losser gaan zitten. Bovendien kan het op de ene plaats meer gaan drukken dan op de andere, waardoor er pijn kan ontstaan. Ook kan het gebit breken omdat er ruimte zit tussen het gebit en de kaak. Als deze klachten ontstaan, moet u naar de tandarts gaan. Meestal is het voldoende om het gebit op te laten vullen met een nieuwe zachte tijdelijke laag, waardoor het weer veel beter zit. Dit aanpassen van het gebit gebeurt gedurende de eerste 5 a 6 maanden. Na deze periode kan het gebit, indien het nog voldoet, aangepast worden tot een definitieve prothese. Wanneer de immediaatprothese niet meer aangepast kan worden, dient er een nieuwe prothese gemaakt te worden.

In de hoop u met deze beknopte informatie van dienst te zijn, groeten wij u vriendelijk

Het team van tandarts Reinders en Partners